

FREEMAK plus

Concentrado Soluble (SL)
BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

FREEMAK plus® posee un alta concentración de aminoácidos libres, complementados con macro y micronutrientes.

FREEMAK plus® combina la acción del nitrógeno orgánico, fósforo y potasio altamente asimilables con los micronutrientes necesarios para mejorar la productividad.

FREEMAK plus® genera una rápida respuesta de frutales, hortalizas y cultivos frente a desbalances nutricionales y factores de estrés que los afecten.

Composición	(%p/v)
Aminoácidos Libres	16.85
Fósforo (P ₂ O ₅)	4.30
Potasio (K ₂ O)	3.70
Boro	0.11
Hierro	0.06
Manganeso	0.04
Zinc	0.03
Cobre	0.01

Metales pesados	As	Cd	Hg	Pb
Ppm	<1.0	<0.7	<0.5	<10

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS A 20°C:

pH (sin diluir): 3.46 pH (sol.10%): 4.7
Densidad.:1.15 g/ml – Solubilidad: 100%

RECOMENDACIONES DE USO

Frutales	Dosis* (L/ha)	Aplicaciones Foliares
Duraznero, Nectarino, Damasco, Ciruelo, Almendro.	2 a 3	Desde brotación a pinta y en condiciones de estrés
Cerezo, Guindo.	2 a 2.5	1 aplicación en brotación y 2 en post-cosecha.
Uva de mesa y vinífera	1.5 a 2	2 aplicaciones: en pre-flor y en floración.
Manzano y Peral.	2 a 3	2 aplicaciones, desde ramillete expuesto hasta inicio de floración.
Nogal. Avellano.	2 a 3	Desde brotación y ante situaciones de estrés.
Arándano.	1 a 1.5	Durante el ciclo de crecimiento y post-cosecha.
Palto, Cítricos	3 a 3.5	En brotación, pre-flor y ante factores de estrés

Vía riego: en caso de actividad fotosintética reducida o que la aplicación foliar no sea posible, aplicar vía riego a la dosis de 5 a 7 L/ha/aplicación. En fertirriego, la dosis depende de tipo de suelo y el desarrollo radicular. Inyectar en último tercio del riego.

* Las aplicaciones sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. La necesidad de las aplicaciones, las dosis y su frecuencia requieren del diagnóstico profesional en terreno y el análisis foliar.

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.

FONOS: 56.2.2558.6540 – 56.2.2558.6774 – 56.9.82499215

www.mabruk.cl

FREEMAK plus

Concentrado Soluble (SL)
BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivos y hortalizas	Dosis (L/ha)	Aplicaciones Foliares
Trigo, cebada, avena	2 a 3	A inicios de macolla y antes de encañado.
Raps	1.5 a 2.5	En estado de roseta y a inicios de flor.
Lupino	1.5 a 2	En floración, cuaje y en formación de vainas.
	cc/100L	
Viveros, almácigos y post-trasplante	150 a 250	Una semana pre-trasplante y post-trasplante. En viveros cada 2 a 3 semanas
Hortalizas y Ornamentales	200 a 300	Cada 2 a 3 semanas y ante situaciones de estrés

Vía riego en hortalizas y ornamentales: en caso de actividad fotosintética reducida o que la aplicación foliar no sea posible, aplicar vía riego a la dosis de 1.5 a 2.5 L/ha/ aplicación. En fertirriego, la dosis depende de tipo de suelo y el desarrollo radicular. Inyectar en último tercio del riego. en cada aplicación.

* Las aplicaciones sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. La necesidad de las aplicaciones, las dosis y su frecuencia requieren del diagnóstico profesional en terreno y el análisis foliar.

PRECAUCIONES

Durante la preparación y la aplicación, usar máscara con filtro, antiparras, overol y guantes impermeables y botas de goma. Si se mezcla con otro producto, considerar las precauciones que este requiere. Lavarse las manos, antebrazos y cara prolijamente, después de manipular el producto y antes de comer, beber, fumar, ir al baño o al final del día. Debe existir un lugar especial para el lavado de ojos y baños de seguridad. **FREEMAK plus®**, aplicado solo, no deja residuos en las plantas tratadas, por lo que no requiere periodo de carencia.

COMPATIBILIDAD

FREEMAK plus® es compatible con todos los productos de la línea **RUKAM®** (salvo con **RUKAM® Cobre**) y la mayor parte de los productos fitosanitarios o abonos normalmente empleados. Sin embargo, antes de proceder a un tratamiento con productos de los cuales no se conoce la reacción, es necesario realizar un ensayo preliminar sobre algunas plantas, observando los efectos 3 a 4 días después. NO usar en mezcla con productos que contengan cobre o aceites minerales.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agitar el envase, llenar con agua hasta la mitad del equipo aplicador, agregar la dosis adecuada del producto, agitar y completar con agua la carga del equipo. Mantener la agitación durante la aplicación.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Marcas registradas de:

MABRUK®
AGRO-INSUMOS

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.

www.mabruk.cl