

RUKAM[®] Calcio

Concentrado Soluble (SL)
BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

Máxima eficiencia en el suministro del ion Calcio en condiciones de alta exigencia productiva

RUKAM[®] Calcio incorpora el ion complejado con aminoácidos facilitando su absorción y transporte lo que permite una rápida corrección de las deficiencias y en condiciones de estrés.

RUKAM[®] Calcio influye en la condición de la fruta, otorgándole una mayor firmeza y resistencia a la degradación enzimática (maduración, desgrane, hair line) y al efecto de patógenos.

RUKAM[®] Calcio aplicado entre cuaja y cosecha permite mejorar la vida de post-cosecha de frutas y hortalizas.

RUKAM[®] Calcio contribuye a la prevención de fisiopatías y otras alteraciones originadas por baja concentración de Ca²⁺ en el citoplasma.

Composición (%p/v)

Aminoácidos..... 8.5
Calcio (CaO)..... 12.4
Boro..... 0.7

Metales Pesados: As Cd Hg Pb
ppm : <1.0 <0.7 <0.5 <5.0

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS A 20°C:

pH: 5.1 pH(sol.10%): 5.5 - Densidad: 1.24 g/ml
Solubilidad: 100%

RECOMENDACIONES DE USO:

Especie frutal	Dosis* (L/ha)	Aplicaciones foliares
Cerezo, Guindo.	3 a 4	3 a 4 aplicaciones, desde 3 semanas antes de cosecha.
Duraznero, Damasco, Almendro, Nectarino, Ciruelo.	2 a 4	3 a 4 aplicaciones a partir de fruto cuajado hasta pre-cosecha.
Arándano.	2.5 a 3	2 a 3 aplicaciones cada 10 a 15 días, a partir de fruto cuajado
Cítricos, Palto	3.5 a 4	2 a 3 aplicaciones cada 10 a 15 días, a partir de frutos de 2 a 3 cm.
Manzano, Peral	2 a 3	Aplicar desde fruto recién cuajado cada 10 a 15 días.
Uva de mesa	2 a 3	1 a 2 aplicaciones desde brotes de 20 a 30 cm hasta pinta. 2 a 4 aplicaciones con las de crecimiento (GA3).
Vid vinífera	3 a 3.5	2 a 3 aplicaciones cada 7 días a partir de baya de 4 a 5 mm.
Frutilla	1 a 2	Desde fruto recién cuajado cada 10 a 15 días.

Vía riego: en caso de actividad fotosintética reducida o que la aplicación foliar no sea posible, aplicar vía riego a la dosis de 4 a 8 L/ha en cada aplicación. En fertirriego, la dosis depende de tipo de suelo y el desarrollo radicular. Inyectar en último tercio del riego.

* Las aplicaciones sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. La necesidad de las aplicaciones, las dosis y su frecuencia requieren del diagnóstico profesional en terreno y el análisis foliar.

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.

FONOS: 56.2.2558.6540 – 56.2.2558.6774 – 56.9.8249921

www.mabruk.cl

RUKAM[®] Calcio

Concentrado Soluble (SL)
BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

RECOMENDACIONES DE USO:

Hortalizas y Flores	Dosis* (L/ha)	Aplicaciones Foliars
Lechuga, Apio y Repollo	0.5 a 1	Iniciar aplicaciones después del trasplante y repetir cada 15 días.
Coliflor y Brócoli	0.5 a 1	Aplicar desde la 6ª hoja. Repetir cada 10 días.
Tomate, Berenjena, Ají, Pepino y Pimentón	1.0 a 1.2	Una aplicación post-trasplante y repetir con nuevos frutos cuajados, cada 7 a 10 días.
Melón y Sandía	0.8 a 1	Iniciar las aplicaciones desde pre-floración. Repetir c/10 días.
Papa	2 a 2.5	2 aplicaciones cada 15 días después de floración.
Almácigos	0.5 a 0.8	1 semana después del trans-plante
Flores de corte	1 cc/L	En situaciones de estrés (falta de luz, heladas, salinidad).

Vía riego: en caso de actividad fotosintética reducida o que la aplicación foliar no sea posible, aplicar vía riego a la dosis de 2 a 5 L / ha / aplicación. En fertirriego, la dosis depende de tipo de suelo y el desarrollo radicular. Inyectar en último tercio del riego.

*Las dosis sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. La necesidad de las aplicaciones, dosis y periodicidad dependen del diagnóstico profesional en terreno, respaldado por el análisis foliar.

PRECAUCIONES

Durante la preparación y la aplicación usar máscara con filtro, antiparras, overol y guantes impermeables y botas de goma. Si se mezcla con otro producto, considerar las precauciones que este requiere. Lavarse las manos, antebrazos y cara prolijamente, después de manipular el producto y antes de comer, beber, fumar, ir al baño o al final del día. Debe existir un lugar especial para el lavado de ojos y baños de seguridad. Al ser aplicado solo, no deja residuos en las plantas tratadas, no requiere período de carencia ni tiene restricciones de ingreso al área tratada.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agitar el envase de **RUKAM[®] Calcio**, llenar con agua hasta la mitad del equipo aplicador, agregar la dosis adecuada del producto, agitar y completar con agua la carga del equipo. Mantener la agitación durante la aplicación.

COMPATIBILIDAD

RUKAM[®] Calcio es compatible con todos los bioestimulantes de la línea **RUKAM[®]**. Antes de proceder a un tratamiento con productos de los cuales no se conoce la reacción, es necesario realizar un ensayo preliminar sobre algunas plantas, observando los efectos 3 a 4 días después. No usar en mezcla con productos que contengan alta concentración de cobre, aceites minerales o surfactantes.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Marcas registradas de

MABRUK[®]
AGRO-INSUMOS

www.mabruk.cl

JULIO 2020