

RUKAM[®] Potasio

Concentrado Soluble (SL)

BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

RUKAM[®] Potasio, incorpora el catión potasio junto con aminoácidos y peptidos de bajo peso molecular al tejido vegetal en forma más rápida y con menor consumo energético, lo que es crucial en situaciones de estrés por factores externos y/o condiciones de alta exigencia productiva en frutales y hortalizas.

RUKAM[®] Potasio, al permitir la inmediata disponibilidad del catión, favorece la maduración y calidad de los frutos, en los que interviene en la formación del color.

Composición	(%p/v)
Aminoácidos	13.2
Potasio (K ₂ O)	18.1

Metales Pesados:	As	Cd	Hg	Pb
ppm	<0.5	<0.7	<0.5	<5.0

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS A 20°C:

pH (sin diluir): 6.3 - pH (0.1 %): 6.1
Densidad (g/ml) 1.46 - Solubilidad: 100%

RECOMENDACIONES DE USO:

Frutales y vides	Dosis* (L/ha)	Aplicaciones Foliars
Duraznero, Nectarino, Damasco, Almendro	3 a 3.5	Aplicar 3 a 4 veces, desde caída de pétalos.
Cerezo, Ciruelo, Guindo	3.5 a 4	Desde fruto cuajado cada 10 días.
Vid de mesa y vinífera.	2 a 3	3 a 4 aplicaciones desde inicio de brotación. En variedades de color, desde cierre de racimo en adelante.
Manzano, Peral	3 a 4	3 a 4 aplicaciones cada 15 días desde caída de pétalos.
Cítricos, Palto	3.5 a 4	Aplicaciones desde fruto cuajado, repetir cada 15-20 días.
Arándano, Frambuesa, Mora, Frutilla	1.5 a 2	Aplicaciones desde fruto cuajado, cada 10-15 días.

Vía riego: 4 a 12 L/ha. La dosis y periodicidad dependen del tipo de suelo y el desarrollo radicular. Inyectar en último tercio del riego.

*Todas las recomendaciones indicadas son una referencia. Las aplicaciones, dosis y periodicidad dependen del diagnóstico profesional en terreno, respaldado –si fuera necesario- por el análisis foliar.

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.

FONOS: 56.2.2558.6540 – 56.2.2558.6774 – 56.9.82499215

www.mabruk.cl

RUKAM[®] Potasio

Concentrado Soluble (SL)

BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivos y Hortalizas	Dosis* (cc/100L)	Aplicaciones Foliares
Acelga, Espinaca, Lechuga, Coliflor, Brócoli	2.5 a 3	2 a 3 aplicaciones desde un mes después del trasplante.
Melón, Sandía, Zapallo	2 a 3	3 a 4 aplicaciones desde fruto cuajado.
Tomate, Pimiento, Pepino	2 a 2.5	Aplicaciones desde fruto formado, repitiendo cada 10-15 días.
Papa	2 a 3	2 a 3 aplicaciones después de la aporca (plantas de 25 a 30 cm)
Remolacha	2 a 2.5	2 a 3 aplicaciones cada 15 días desde 6 hojas verdaderas
Ajo y cebolla	2 a 3	2 a 3 aplicaciones un mes antes de la cosecha.
Zanahoria	2 a 3	2 a 3 aplicaciones cada 15 días a partir de 3 hojas verdaderas

Vía riego: 4 a 8 L / ha en cada aplicación. En fertirriego, la dosis depende de tipo de suelo y el desarrollo radicular. Inyectar en último tercio del riego.

*Las dosis sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. Siempre es conveniente la evaluación profesional en terreno y el análisis foliar.

PRECAUCIONES

Durante la preparación y la aplicación usar máscara con filtro, antiparras, overol y guantes impermeables y botas de goma. Si se mezcla con otro producto, considerar las precauciones que este requiere. Lavarse las manos, antebrazos y cara prolijamente, después de manipular el producto y antes de comer, beber, fumar, ir al baño o al final del día. Debe existir un lugar especial para el lavado de ojos y baños de seguridad. Al ser aplicado solo, no deja residuos en las plantas tratadas, no requiere período de carencia ni tiene restricciones de ingreso al área tratada.

COMPATIBILIDAD

RUKAM[®] Potasio es compatible con todos los bioestimulantes de la línea **RUKAM[®]**. **En el caso que se considere necesario la mezcla con RUKAM Cobre, utilizar la dosis mínima de este producto.** Antes de proceder a un tratamiento con productos de los cuales no se conoce la reacción, es necesario realizar un ensayo preliminar sobre algunas plantas, observando los efectos 3 a 4 días después. No usar en mezcla con productos que contengan cobre, aceites minerales o surfactantes.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agitar el envase de **RUKAM[®] Potasio**, llenar con agua hasta la mitad del equipo aplicador, agregar la dosis adecuada del producto, agitar y completar con agua la carga del equipo. Mantener la agitación durante la aplicación.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Marcas registradas de

MABRUK[®]
AGRO-INSUMOS

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.

www.mabruk.cl

Septiembre 2020